

Los centros de salud comienzan a dar citas para la vacunación contra el papilomavirus

Las niñas nacidas en 1994 serán las primeras beneficiarias de esta nueva medida preventiva contra las infecciones genitales que se incluye en el calendario vacunal

Los centros de atención primaria han comenzado ya a dar citas para la administración de la vacuna contra el papilomavirus, que empezará a realizarse a partir del próximo 15 de septiembre. Las primeras beneficiarias de esta nueva medida preventiva que se incluye en el calendario vacunal andaluz serán aquellas niñas nacidas en 1994 y que, por tanto, a lo largo de 2008 han cumplido o van a cumplir los 14 años.

Para solicitar una cita, los ciudadanos podrán utilizar los sistemas habituales Salud Responde (902 505 060) o acudir al centro de salud, donde le concretarán día y hora para poner la primera dosis de la vacuna.

En Andalucía, existen actualmente un total de 45.507 niñas con 14 años, de las que 3.629 corresponden a Almería; 6.786 a Cádiz; 4.547 a Córdoba; 5.074 a Granada, 2.738 a Huelva; 4.204 a Jaén; 8.088 a Málaga; y 10.441 a Sevilla. Para vacunarlas a todas ellas, la Consejería de Salud ha invertido 12,1 millones de euros en adquirir las 152.312 dosis necesarias para completar la pauta de esta vacuna (tres dosis) y poder iniciar en enero de 2009 la vacunación sobre las niñas que nacieron en 1995 y que, por tanto, cumple 14 años a lo largo del próximo año.

La vacuna del cáncer de cérvix supone un paso más en la lucha contra el cáncer, aunque hay que incidir en la necesidad de mantener medidas básicas de prevención y detección precoz de las infecciones genitales como son el uso del preservativo y las citologías periódicas.

El programa de detección precoz de cáncer de cuello de útero que se desarrolla en Andalucía y que se enmarca en el Proceso Asistencial de Cáncer de Cérvix está siendo utilizado cada vez por más mujeres en Andalucía.

Se estima que cada año se producen en el mundo más de 500.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y alrededor de 280.000 defunciones. Cifras que en España y Andalucía son muy inferiores gracias a los programas de cribado existentes. En este sentido, a nivel nacional se registran 7,6 casos de este tipo de cáncer por cada 100.000 mujeres y 7,9 por cada 100.000 mujeres en Andalucía. En la misma línea, las últimas cifras publicadas sobre esta materia por el Instituto Nacional de Estadística recogen que 604 mujeres fallecieron en 2006 por cáncer de cuello de útero, de las que 104 correspondieron a Andalucía.

Administración de la vacuna

La vacuna contra el papilomavirus consta de tres dosis que se deben administrar con una pauta concreta. Así, la segunda y tercera dosis se pondrá al mes y a los seis meses de la primera, respectivamente.

La Consejería de Salud estima que las niñas nacidas en 1994 habrán terminado de vacunarse entre abril y junio de 2009, año en el que comenzará a administrarse a las niñas nacidas en 1995 y, así, sucesivamente.

La vacuna protege sobre dos cepas de virus, que representan el 70-75% de los más frecuentes que pueden degenerar en un cáncer de cuello de útero. Junto a esta medida, es fundamental la realización de citologías periódicas como método para la detección precoz de posibles infecciones genitales que pueden derivar en carcinomas, al objeto de poner medidas correctoras a tiempo que permitan que el cáncer no se llegue a desarrollar.

El programa de detección precoz de cáncer de cérvix establece que las mujeres que presenten factores de riesgo (múltiples parejas, infecciones virales, inmunosupresión...) se realicen una citología cada año, mientras que para las

que no tienen factores de riesgo aparente la cadencia de la prueba debe ser anual, y en el caso de que se registren dos consecutivas normales, se pase a realizar este tipo de pruebas cada tres años. Además, indica que se puede finalizar el control citológico en las mujeres con más de 65 años que tengan dos citologías normales.

Hábitos sexuales

La última Encuesta de Salud Pública (2003) indica que la mitad de las niñas andaluzas, al igual que las españolas, mantienen sus primeras relaciones sexuales con 19,1 años, y que entre los 15,9 y los 19,1 años, el 32,5% de las mujeres ya han mantenido relaciones sexuales, un promedio que desciende conforme desciende la edad.

Del mismo modo, recoge que el uso del preservativo en la primera relación sexual es cada vez más frecuente. Entre las personas de 40 y más años, sólo el 31,5% indicó haberlo usado, mientras que el 79,6% de los menores de 30 años manifestó haberlo utilizado.

Más información

La Consejería de Salud ha puesto a disposición de los ciudadanos toda la información necesaria sobre la nueva vacuna. Así, a través de Salud Responde, se pueden resolver las dudas relativas a la edad en la que se tiene que poner, cómo se producirá la inclusión y de qué manera se irán vacunando a las niñas.

Por su parte, la página web de la Consejería ofrece a través de 'informarse.es salud' información de interés sobre esta cuestión y se han editado folletos y carteles para su distribución en los centros sanitarios. Además, los médicos de familia, enfermeras, pediatras y ginecólogos tienen a su disposición un documento con todas las cuestiones técnicas que rodean a esta vacuna.