

Un estudio encuentra numerosos errores en pruebas clínicas en AP

Las pruebas clínicas efectuadas en las consultas de medicina de familia de Estados Unidos muestran errores a lo largo de todo el proceso y los fallos afectan desproporcionadamente a las minorías. Tales son las conclusiones del mayor estudio sobre esta cuestión realizado hasta la fecha, que se publica en *Quality and Safety in Health Care*.
[15/08/2008](#)

Los investigadores señalan que los problemas detectados llevan a pérdida de tiempo y dinero, a retrasos en el acceso al tratamiento y a un mayor sufrimiento en los pacientes. Los errores más comunes (24,6 por ciento del total) tenían relación con fallos en la comunicación de los resultados al facultativo. Los siguientes más frecuentes eran los de tipo administrativo o la deficiente realización de la propia prueba.

Estos últimos errores eran el doble de frecuentes en pacientes de minorías étnicas. Según los autores del estudio, la razón puede estar en la falta de seguro del enfermo o en problemas para acceder al centro donde se realizaban las pruebas.

Una cuarta parte de las deficiencias halladas tuvieron como consecuencia un retraso en la terapia y el 13 por ciento causaron dolor o reacciones adversas. El 18 por ciento provocaron algún tipo de daño al paciente.

John Hickner, profesor de la Universidad de Chicago, señala que “el hallazgo más chocante es que los pacientes de minorías tenían tres veces más probabilidades de experimentar efectos adversos y el doble de sufrir daño físico por los errores”.

Los investigadores apuntan a que “los errores en las pruebas clínicas parecen muy comunes. Y, dado que muchos no se detectan o no se comunican, podemos suponer que los datos del estudio son muy inferiores a los reales”. Las conclusiones del trabajo también “indican la importancia de mejorar el manejo de pruebas en atención primaria”.

Diario Médico